

Futter-Information für Meerschweinchen

Art	Besonderheiten	Wirkung	Fütterung
Agave	giftig		NEIN
Alfalfa			nur frisch
Aloe Vera	giftig		NEIN
Alpenveilchen	giftig		NEIN
Amaryllis	giftig		NEIN
Ananas	hoher Säure- und Zuckergehalt		nur selten in kleinen Mengen
Anthurie	giftig		NEIN
Apfel (Zweig)			
Apfel (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt, Kerne enthalten Blausäure		ohne Kerne: JA
Aronstab	giftig		NEIN
Aubergine	unreif: giftig (Solanin)		nur ganz reife Früchte ohne Stielansatz: JA
Avocado	manche Sorten sind hochgiftig	kann Durchfall verursachen	NEIN
Azalee	giftig		NEIN
Bambus (Blatt)	sehr abbrasiv	erhöhter Zahnabrieb	frische Blätter
keine Zierbambusarten			
Banane	hoher Zuckergehalt	verursacht Verstopfung	nur selten kleine Mengen
Bärenklau	giftig		NEIN
Bärlauch	giftig		NEIN
Basilikum			
Berglorbeer	giftig		NEIN
Bilsenkraut	giftig		NEIN
Bingelkraut	giftig		NEIN
Birke (Blatt)	hoher Gerbsäuregehalt	stark Harn treibend	
Birne (Zweig)			
Birne (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt, Kerne enthalten Blausäure	kann Durchfall verursachen	ohne Kerne: nur selten kleine Mengen
Bittersüßer Nachtschatten	giftig		NEIN
Blattspinat	hoher Oxalsäuregehalt	kann Steinbildung verursachen, Ca-Stoffwechselstörungen	nur kleine Mengen
Blauregen	giftig		NEIN
Blumenkohl		verursacht starke Blähungen	NEIN
Bocksdorn	giftig		NEIN
Bohne	giftig	verursacht starke Blähungen	NEIN
Brennesselkraut	sehr hoher Vitamingehalt: C	Harn treibend, Blutdruck senkend	nur getrocknet
Broccoli	hoher Oxalsäuregehalt, hoher Vitamingehalt: C	stärkt Immunsystem, kann Steinbildung verursachen, Ca-Stoffwechselstörungen	nur kleine Mengen
Brombeere	hoher Zuckergehalt		nur kleine Mengen
Brombeere (Blatt)	hoher Gerbsäuregehalt		nur getrocknet
Brot	hoher Stärkegehalt, möglicher Schimmelsporengehalt	Getrocknetes Brot nutzt die Zähne NICHT ab, da es im Maul aufweicht! senkt pH-Wert im Darm	NEIN
Buche (Blatt)	hoher Oxalsäuregehalt		nur kleine Mengen
Buchsbaum	giftig		NEIN
Buschwindröschen	giftig		NEIN
Cherimoya		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Chicorée	hoher Oxalsäuregehalt in den äußeren Blättern	kann Blähungen verursachen	nur kleine Mengen
Chinakohl		verursacht starke Blähungen	erst nach langsamer Gewöhnung: nur kleine Mengen
Christrose	giftig		NEIN
Christusdorn	giftig		NEIN
Cranberry (Frucht)	enthalten Antioxidantien	entzündungshemmend, auch vorbeugend	JA
Curuba		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Dill		Appetit anregend, Verdauung fördernd, regt Milchbildung an, lindert Blähungen	
Echinacea		stärkt die Abwehrkräfte	nur gesunden Tieren verfüttern
Edeltanne (Zweig)		gut verträglich	JA
Efeu	giftig		NEIN
Eibengewächse	giftig		NEIN
Eiche (Zweig)	arzneilich wirksame Bestandteile	(heilend)	nur nach tierärztlicher Verordnung
Einblatt	giftig		NEIN
Eisbergsalat		kann Durchfall verursachen	nur kleine Mengen
Eisenhut	giftig		NEIN
Endiviansalat	hoher Mineralgehalt: Ca, Fe, Ka, P hoher Vitamingehalt: A, B, C	kann Durchfall verursachen, Galle- und Harn treibend, appetitanregend	nur kleine Mengen
Erbse		verursachen starke Blähungen	NEIN
Erdbeere (Blatt)			nur kleine Mengen
Erdbeere (Frucht)	hoher Zuckergehalt		nur kleine Mengen
Erlé			
Essigbaum	giftig		NEIN
Estragon		Appetit anregend, lindert Blähungen	
Farn (alle Arten)	giftig		NEIN
Feldsalat		kann Durchfall verursachen, kann Urin färben	nur kleine Mengen
Fenchel (Knolle)	hoher Mineral- und Vitamingehalt: C	hilft gegen Verdauungsbeschwerden	Knolle und Grün: JA
Fensterblatt	giftig		NEIN
Fingerhut	giftig		NEIN
Frühlingszwiebeln		reizt Schleimhäute	NEIN
Gänseblümchen		leicht abführend, unterstützen Heilungsprozess bei Lungenerkrankheiten	nur frisch
Geranie	giftig		NEIN
Getreidehalme		bei Lungenkrankheiten	nur ohne Körner
Getreidekörner	hoher Stärkegehalt	verursacht Verdauungsstörungen	NEIN
Giersch			nur frisch
Ginster	giftig		NEIN
Goldregen	giftig		NEIN
Golliwog			
Granatapfel		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN

Futter-Information für Meerschweinchen

Art	Besonderheiten	Wirkung	Fütterung
Gras, frisch (siehe auch Heu)			kann nach Anfütern in großen Mengen verfüttert werden
Grüner Hafer			nur ohne Körner
Grünkohl	hoher Mineral- und Vitamingehalt	verursacht starke Blähungen	erst nach langsamer Gewöhnung: nur winzige Mengen
Guave		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Gundermann	giftig		NEIN
Gurke (alle Sorten)	hoher Elektrolytgehalt	kann Durchfall verursachen	JA
Hagebutte	hoher Vitamingehalt: C		ohne Kerne: JA
Hahnenfuß	giftig		NEIN
Hartriegel	giftig		NEIN
Haselnuss (Blatt)			
Haselnuss (Frucht)			NEIN
Heckenkirsche	giftig		NEIN
Heidelbeere	hoher Säure- und Zuckergehalt		nur kleine Mengen
Herbstzeitlose	giftig		NEIN
Heu	essentielles Grundnahrungsmittel	fördert Zahnabrieb	immer ausreichende Menge anbieten
Himbeerblätter			
Himbeere	hoher Säure- und Zuckergehalt		nur kleine Mengen
Hirtentäschel		Blut stillend, Wehen fördernd	nicht an trächtige Tiere verfüttern
Holunder	giftig		NEIN
Hufattich			
Hülsenfrüchte		verursachen starke Blähungen	NEIN
Hundspetersilie	giftig		NEIN
Hyazinthe	giftig		NEIN
Ilex	giftig		NEIN
Johannisbeerblätter			
Johannisbeere	hoher Säure- und Zuckergehalt		nur kleine Mengen
Johanniskraut		gegen Appetitlosigkeit, wundheilend	
Kalk (-leckstein)	hoher Kalziumgehalt	begünstigt Organverkalkung, Steinbildung	NEIN
Kalla	giftig		NEIN
Kamille		entzündungshemmend, Verdauung fördernd, heilt Atemwegserkrankungen	auch als Tee (kalt) oder Dampfbad
Karotte (Blatt)	hoher Kalziumgehalt		nur kleine Mengen
Karotte (Wurzel)	hoher Zuckergehalt	kann Urin färben	JA, gutes Winterfutter
Kartoffel (Blatt)	giftig		NEIN
Kartoffel (Knolle)	enthält schlecht verdauliche Stärke Grüne Stellen, Grün und Triebe sind giftig		NEIN
Kastanie (Zweig)	arzneilich wirksame Bestandteile	(heilend)	nur nach tierärztlicher Verordnung
Kirsche (Zweig)	hoher Blausäuregehalt		NEIN
Kirsche (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Kirschlorbeer	giftig		NEIN
Kiwi	hoher Säure- und Zuckergehalt hoher Vitamingehalt: C	reizt Haut, säuert Urin	ohne Schale: nur kleine Mengen
Kohl		verursachen starke Blähungen	NEIN
Kohlrabi		verursacht starke Blähungen	NEIN
Kohlrübe	hoher Vitamingehalt		JA, gutes Winterfutter
Kopfsalat	hoher Nitratgehalt		NEIN
Koriander (Blatt)		Appetit anregend, lindert Blähungen, entkrampfend	
Kornblume			nur Blüte
Kornwicke	giftig		NEIN
Kumquat		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Kürbis (alle für menschlichen Verzehr geeigneten Arten)	hoher Vitamingehalt: A, C, E		JA, gutes Winterfutter
Lattich	hoher Vitamingehalt	kann Durchfall verursachen	nur kleine Mengen
Lauch		reizt Schleimhäute	NEIN
Lebensbaum	giftig		NEIN
Liebstockel		Harn treibend, entkrampfend	
Liguster	giftig		NEIN
Lilie	giftig		NEIN
Linde (Blatt)		stark Harn treibend	
Linse		verursachen starke Blähungen	NEIN
Litchi		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Lonicera	giftig		NEIN
Löwenzahn (Wurzel und Blatt)		Harn treibend, Appetit anregend, kann Urin rot färben	
Lupine	giftig		NEIN
Luzerne	hoher Eiweißgehalt, hoher Kalziumgehalt	Gefahr von Organschäden	nur sehr selten, frisch
Maggikraut		Harn treibend, entkrampfend	
Maiglöckchen	giftig		NEIN
Mais (Blatt)	sehr abrasiv	fördert Zahnabrieb	nur ungespritzt, auch getrocknet
Mais (Körner oder Kolben)	kalorienreich	machen dick	
Malve, wilde			nur frisch
Mandarine	hoher Vitamingehalt: C	reizt Haut, säuert Urin	ohne Schale: nur selten kleine Mengen
Mango		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Mangold	hoher Oxalsäuregehalt	kann Steinbildung verursachen, Ca-Stoffwechselstörungen	nur kleine Mengen
Melisse		Verdauung fördernd, Krampf stillend, Magen stärkend, lindert Blähungen	
Melone	hoher Flüssigkeits- und Zuckergehalt	begünstigt Diabetes	JA, gutes Sommerfutter
Minze		kann Milchbildung herabsetzen	nicht an säugende Muttertiere verfüttern
Mirabelle (Zweig)	hoher Blausäuregehalt		NEIN
Mirabelle (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Mistel	giftig		NEIN
Möhre (Blatt)	hoher Ca-Gehalt		nur kleine Mengen
Möhre (Wurzel)	hoher Zuckergehalt	kann Urin färben	JA, gutes Winterfutter
Narzisse	giftig		NEIN
Nektarine	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Nuss (Blatt)			

Futter-Information für Meerschweinchen

Art	Besonderheiten	Wirkung	Fütterung
Nuss (Frucht)	Blausäuregehalt		NEIN
Oleander	giftig		NEIN
Orange	hoher Vitamingehalt: C	reizt Haut, säuert Urin	ohne Schale: nur selten kleine Mengen
Oregano			
Osterglocke	giftig		NEIN
Papaya		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Paprika (alle Farben)	hoher Vitamingehalt: C, Stiel und -ansatz giftig		ohne Stielansatz: JA
Pastinake			JA, gutes Winterfutter
Petersilie (Blatt)		Harn treibend, Wehen fördernd	nicht an trächtige Tiere verfüttern
Petersilie (Wurzel)			JA, gutes Winterfutter
Pfefferminze (Blatt)		Krampf stillend, Verdauung fördernd, lindert Verstopfung und Blähungen, kann Milchbildung herabsetzen	nicht an säugende Muttertiere verfüttern
Pfirsich (Zweig)	hoher Blausäuregehalt		NEIN
Pfirsich (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Pflaume (Zweig)	hoher Blausäuregehalt		NEIN
Pflaume (Frucht)	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Physalis		verursacht schwere Verdauungsstörungen	NEIN
Pilze			NEIN
Porree		reizt Schleimhäute	NEIN
Primel	giftig		NEIN
Quitte	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Radieschen (Blatt)			JA
Radieschen (Knolle)	enthalten Senfölglycoside	reizen Atemwege	NEIN
Rapunzel		kann Durchfall verursachen, kann Urin färben	nur kleine Mengen
Rauke	hoher Nitratgehalt		nur winzige Mengen
Rebendolde	giftig		NEIN
Rettich	enthalten Senfölglycoside	reizen Atemwege	NEIN
Rhabarber	hoher Oxalsäuregehalt		NEIN
Ringelblume (Blüte)		beruhigend	
Robinie	giftig		NEIN
Romanasalat	hoher Vitamingehalt	kann Durchfall verursachen	nur kleine Mengen
Romanasalat	hoher Vitamingehalt	kann Durchfall verursachen	nur kleine Mengen
Römersalat	hoher Vitamingehalt	kann Durchfall verursachen	nur kleine Mengen
Rosenkohl		verursachen starke Blähungen	NEIN
Rosmarin			
Rote Beete	hoher Oxalsäuregehalt	kann Steinbildung verursachen, Ca-Stoffwechselstörungen	nur kleine Mengen
Rotkohl		verursachen starke Blähungen	NEIN
Rottanne (Zweig)		gut verträglich	JA
Ruccola	hoher Nitratgehalt		nur winzige Mengen
Sadebaum	giftig		NEIN
Salbei	hoher Thujongehalt	Schmerz lindernd, Durchfall lindernd	nur kleine Mengen
Salz (-leckstein)	hoher Kochsalzgehalt	u. U. LEBENSGEFAHR	NEIN
Sauerampfer	hoher Oxalsäuregehalt		
Sauerklee	giftig		NEIN
Schafgarbe		Appetit anregend, heilt Blasen- und Nierenerkrankungen	
Schalotten		reizt Schleimhäute	NEIN
Schlierling	giftig		NEIN
Schmetterlingsstrauch	giftig		NEIN
Schneebeere	giftig		NEIN
Schneeglöckchen	giftig		NEIN
Schnittlauch		reizt Schleimhäute	NEIN
Schöllkraut	giftig		NEIN
Seidelbast	giftig		NEIN
Sellerie (alle Teile)	hoher Mineralgehalt		JA
Sommerflieder	giftig		NEIN
Sonnenblume (Grün und Blüte)			
Sonnenblume (Korn)			NEIN
Spargel		stark Harn treibend	nur kleine Mengen, zusätzlich Wasser reichen
Spinat	hoher Oxalsäuregehalt	kann Steinbildung verursachen, Ca-Stoffwechselstörungen	nur kleine Mengen
Spitzwegerich		Erkältung lindernd, Blasen- und Nieren heilend	nur Kraut
Staudensellerie	hoher Mineralgehalt		JA
Stechapfel	giftig		NEIN
Steckrübe	hoher Vitamingehalt		JA, gutes Winterfutter
Steinobst	hoher Säure- und Zuckergehalt	kann Durchfall verursachen	NEIN
Stielmus			
Tanne, Weihnachts- (Zweig)	giftig, da gespritzt		NEIN
Taubnessel			
Thuja	giftig		NEIN
Thymian		heilt Atemwegserkrankungen	
Timothy Heu (siehe Heu)			
Tollkirsche	giftig		NEIN
Tomate	Stiele und Blätter sind giftig	kann Durchfall verursachen	ohne Stielansatz: nur kleine Mengen
Topinambur (alle Teile)			JA
Traube (rot und weiß)	hoher Gerbsäuregehalt in der Schale		ohne Kerne: nur selten
Trockenfutter	hoher Energiegehalt	sättigt; das Tier nimmt wichtige Nahrungsmittel wie Heu nur noch in unzureichender Menge auf. Folge: Verdauungsprobleme, Zahnprobleme	generell: NEIN nur an Tiere im Wachstum verfüttern, nur bei Außenhaltung im Winter, nur getreide- und melassefreie Pellets maximal 1 Teelöffel je Tier und Tag
Vitamin C - Zusatz im Trinkwasser	hoher Vitamingehalt C	begünstigt Nierenschäden, Steinbildung	NEIN, im Bedarfsfall keine korrekte Dosierung möglich
Vogelmiere			

Futter-Information für Meerschweinchen

Art	Besonderheiten	Wirkung	Fütterung
Wacholder	giftig		NEIN
Walnuss (Blatt)			
Walnuss (Frucht)	Blausäuregehalt		NEIN
Wassermelone	hoher Flüssigkeits- und Zuckergehalt	begünstigt Diabetes	JA, gutes Sommerfutter
Weide (Zweig)	hoher Gerbsäuregehalt		NEIN
Weintraube (rot und weiß)	hoher Gerbsäuregehalt in der Schale		ohne Kerne: nur selten
Weißkohl		verursachen starke Blähungen	NEIN
Weißtanne (Zweig)		gut verträglich	JA
Wiesenheu (siehe Heu)			
Wolfsmilchgewächse	giftig		NEIN
Wunderstrauch	giftig		NEIN
Zierkürbis			NEIN
Zitronenmelisse		Verdauung fördernd, Krampf stillend, Magen stärkend, lindert Blähungen	
Zucchini			JA
Zuckermais (Blatt)			nur ungespritzt, auch getrocknet
Zuckermais (Körner, Kolben)	kalorienreich	machen dick	
Zuckermelone	hoher Flüssigkeits- und Zuckergehalt	begünstigt Diabetes	JA, gutes Sommerfutter
Zwiebel		reizt Schleimhäute	NEIN

Möglichst ungespritzte Qualität verfüttern, ggf. gut waschen oder schälen

Frische Kräuter: können unbegrenzt verfüttert werden

Getrocknete Kräuter: maximal 1 Handvoll je Tier höchstens jeden zweiten Tag und stets mit ausreichender Trinkwasserversorgung

Futterwechsel sollte selten und darf nur langsam erfolgen (Darmumgewöhnung), auch Trockenfutter nur langsam absetzen (über 2 bis 3 Wochen)

Jahreszeitliches Umsetzen von Innen- in Außengehege und umgekehrt ebenfalls mit 2- bis 3-wöchiger Umgewöhnung durch langsam gesteigerte Zugabe/Entzug von Gras